

မိုးရာသီ စပါးအခြောက်စိုက်ခင်းများတွင် ဖိုးလမင်းကျိုင်း ကျရောက်
ဖျက်ဆီးမှုပြုသနာများဖြေရှင်းရန်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း များနှင့်
နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ

ခင်မာမြိုင်


လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိ
ပိုးမွှားသုတေသနဌာနစု
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန

၁၂.၈.၂၀၂၃


ဈေးယာသီရိမြို့နယ်တောင်သူ ဦးမိုးဝင်း (ကြို့ပင်)



ဖိုးလမင်းကျိုင်းဘဝစက်ဝန်း



စဉ်	ဖိုးလမင်းကျိုင်းကျရောက်ဖျက်ဆီးသောသီးနှံများ	ဖိုးလမင်းကျိုင်းကျရောက်ဖျက်ဆီးသော သစ်ပင်ကြီးများ
၁	အာလူး၊	မန်ကျည်း
၂	ကန်စွန်းဥ၊	ထနောင်း
၃	မြေပဲ၊	တမာ
၄	ပြောင်း	ကုက္ကို
၅	ကြံ၊ကြက်ဆူ၊	သရက်
၆	အုန်း	ဇီးပင်
၇	အာလူး၊	ငှက်ပျော
၈	လူးဆပ်၊	မာလကာ
၉	နွားစာပြောင်း	ဒန်သလွန်
၁၀	နှမ်း	ချုံဖုတ်များ
၁၁	နှင်းဆီ	အလှူစိုက်ပင်များ



မိုးလမင်းကျိုင်း၏အလေ့အထများ

- ကျိုင်းကောင် - မေ၊ ဇွန်မှာ ကျိုင်းကောင်ပြန်ပေါက်ပါသည်။
- ကျိုင်းကောင် - နေဝင်စချိန်မှ စ၍တညလုံးစားသောက်ဖျက်ဆီး
- မိုးလင်း - မြေကြီးထဲပြန်ဝင်
- အခါတိုင်း - ဥအု၊ ၂ ပတ်ကြာ အကောင်ပေါက်
- ပိုးလောက်ကောင် - ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ စားသောက်ဖျက်ဆီးပါသည်
- သဲဆန်တဲ့မြေ၊ မွနေတဲ့မြေ၊
- စလက္ခ မှ ၃ပေအနက်အထိမြေကြီးအတွင်း ထိုးဝင်နိုင်ပါသည်

ဖိုးလမင်းကျိုင်းဖျက်ဆီးမှုလက္ခဏာ

- ဖိုးလမင်းကျိုင်း - မိုးရာသီစိုက်သော သီးနှံများတွင် အဓိက ကျရောက်
- ကျိုင်းကောင်သည် - အရွက်များကို ညအခါတွင်စားသောက်ဖျက်ဆီး
- ဖိုးလမင်းကျိုင်း ပိုးလောက်ကောင် - အမြစ်တွေကိုစားသောက်ဖျက်ဆီး
- ပြင်းပြင်းထန်ကျရောက် - အကွက်လိုက်သေ
- အထွက်နှုန်း - ၄၀-၈၀ % အထိဆုံးရှုံးနိုင်



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

- စပါးစိုက်ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်/မစိုက်မီ ထယ်နက်နက်ထိုးရမည်။ သို့မှသာမြေတွင်းခိုအောင်းနေသော ဖိုးလမင်းကျိုင်းများ၊ ရုပ်ဖုံးများသေသွားပါမည်။
- ရိုးပြတ်များဖယ်ရှားရန်
- စိုက်ခင်းအနီး တမာပင်၊ မန်ကြီးပင် နှင့်ထနောင်ပင်များ ကဲ့သို့ဖိုးလမင်းကျိုင်းခိုအောင်နိုင်သောအပင်ကြီးများရှိပါက ကျိုင်းကောင်ပေါက်ချိန် မေ၊ ဇွန်မှာ ကိုင်းများလှုပ်၍ခါပြီးကျိုင်းကောင်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းသင့်ပါသည်။
- ကြားလိုက်ပေးရန် - အစိုဓါတ်ရှိရန်လို

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

- ၎င်းအပင်များ- ကိုင်းများကိုလည်း ကျိုင်းကောင်များ မခိုအောင်းနိုင်အောင်ခုတ်ထားသင့်
- ယခင်နှစ်မှဖိုးလမင်းကျိုင်းကျရောက်သောဖူးပါက ယခုနှစ်တွင် ထယ်ထိုးထွန်မွေချိန်တွင် ဂရုစိုက်၍ ဖိုးလမင်းကျိုင်းပိုး လောက်ကောင်များကောက်ရန်
- သီးနှံမစိုက်မီမြေတွင်းအောင်ပိုးသတ်ဆေး(တော်ပီဒိုဒဂျီ)၅-၆ထုပ်/ဧက
- G5 (Carbonsulfan 5%) ၂ - ၃ ထုပ်/ဧက
- ထယ်ထိုးထွန်မွေချိန်မှာ - ဖိုးလမင်းကျိုင်းကောင်တွေကို ကောက်ရမယ်
- စိုက်ခင်းကို ရေလွှမ်းပေရန်
- ဖိုးလမင်းကျိုင်းပြဿနာ မဖြစ်ခင် ကြိုဖျန်း
- လူစုလူဝေးနဲ့ကောက်ခြင်း

ဆေးနှုန်းထားများ

ဘလိပ် 25 WDG (Thiametoxan)	၁၀-၂၀ဂရမ်/ရေငှက်လံ
ဒီဇာ 70WDG (Imidacloprid 70%)	၁၀-၂၀ဂရမ်/ရေငှက်လံ
ဖိုင်းယား 20EC (Carbosalfan 20EC)	၄၀-၅၀ဂရမ်/ရေငှက်လံ
ဗိုက်တာဂို 40WG (Chlorantranilipole 20%+ Thiamethoxam 20%)	၆ဂရမ်/ရေငှက်လံ
ဇွန်ဘီ (Cartap 95SP)	၂၀-၃၀ဂရမ်/ရေငှက်လံ



ကျေးဇူးတင်ပါသည်။